

異なるワクチンの接種間隔の変更について

現行

接種ワクチン

次に接種する異なる
ワクチン

生ワクチン

BCG、MR、麻しん、風しん、水痘
おたふくかぜ、ロタウイルス、黄熱

27日以上あける

生ワクチン

27日以上あける

不活化ワクチン

不活化ワクチン

B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、
三種混合、二種混合、ポリオ、日本脳炎、子
宮頸がん予防、季節性インフルエンザ、高齢
者肺炎球菌

6日以上あける

生ワクチン

6日以上あける

不活化ワクチン

A型肝炎、狂犬病、破傷風、成人用ジフテ
リア、髄膜炎菌感染症、带状疱疹

変更後

接種ワクチン

次に接種する異なる
ワクチン

注射生ワクチン

BCG、MR、麻しん、風しん、水痘
おたふくかぜ、黄熱

27日以上あける

注射生ワクチン

制限なし

経口生ワクチン

制限なし

不活化ワクチン

制限なし

経口生ワクチン

ロタウイルス

制限なし

注射生ワクチン

制限なし

経口生ワクチン

制限なし

不活化ワクチン

不活化ワクチン

B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混
合、三種混合、二種混合、ポリオ、日本脳
炎、子宮頸がん予防、季節性インフルエン
ザ、高齢者肺炎球菌

制限なし

注射生ワクチン

制限なし

経口生ワクチン

制限なし

不活化ワクチン

A型肝炎、狂犬病、破傷風、成人用ジフテ
リア、髄膜炎菌感染症、带状疱疹

《現行どおり》

※特に医師が認めた場合、同時接種を行うことができます。

※ヒブワクチンやロタワクチンなど同一ワクチンを複数回接種する必要がある場合、接種間隔は添付文書や説明書に従ってください。

【例】ロタリックス1回目→ロタリックス2回目 《27日以上の間隔をあけて接種》

ヒブ初回1回目→ヒブ初回2回目 《27日以上（標準的には56日まで）の間隔をあけて接種》